

ERCP or MRI (MRCP) 四種檢查中，至少兩種顯示明確慢性胰臟炎變化。

(三) 確實排除鄰近器官造成腹痛之可能性。

三、慢性胰臟炎引起腹痛治療之原則

(一) 病人衛教：低油飲食。

(二) 先使用非成癮性止痛劑，通常於飯前服用效果較好，應隨病情調整劑量及頻次，可加以酵素療法增加其效果。

(三) 長期依賴止痛劑之病人，如病情需要可適時增加以下療法：octreotide 注射，celiac plexus block，內視鏡治療 (pancreatic duct stenting、pan-

creatic stone removal or pseudocyst drainage等) 或外科治療。

(四) 以上方法無法控制疼痛時才考慮使用成癮性止痛劑。選擇成癮性較低之藥物以最小有效劑量開始，以後再視病情調整，與非成癮性止痛劑合併使用可以適度減低成癮性止痛劑之劑量。成癮性藥物之使用原則及其管制，依管制藥品管理條例之規定執行之。

(五) 慢性胰臟炎病人如需長期使用成癮性麻醉藥品治療時，應依行政院衛生署訂定之「醫師為非癌症慢性頑固性疼痛病人使用成癮性麻醉藥品注意事項」辦理。



法規宣導活動

法規宣導活動

由本局主辦之94年管制藥品管理法規宣導講習業已陸續展開，首場於94年3月31日由南投縣衛生

局假南投縣藥師公會第21屆第3次會員大會活動時間辦理管制藥品管理法規宣導，由本局派員講解。



處分案例報導

處分案例報導

93年11月24日本局會同臺北縣政府衛生局執行「93年度不法藥物、食品第4次聯合稽查專案計畫」時，於該轄某藥局查獲不明成分白色藥粒78粒，經臺北縣政府衛生局送請行政院衛生署藥物食品檢驗局檢驗結果，檢驗出含有第4級管制藥品Estazolam

成分。臺北縣政府衛生局並於94年01月28日取具談話紀錄，該藥局未領有管制藥品登記證，違反管制藥品管理條例第16條第2項規定，購買第4級管制藥品，爰依同條例第39條規定，處新臺幣6萬元罰鍰。



業務及活動報導

1. 為防範管制藥品由合法流通管道轉為非法使用，以及因不當管理與使用，造成誤用、濫用或流用，本局將針對Ephedrine、Ergometrine、Ergotamine、Lysergic acid、Methylephedrine、Phenylpropanolamine及Pseudoephedrine等可能被用於合成毒品之先驅原料藥，以及Flunitrazepam、Diazepam、Alprazolam及Nimetazepam等被濫用較嚴重之藥品，實施專案實地查核。
2. 為防制學生於寒假春節期間，發生濫用藥物等不法行為，本局於1月14日寄送「小心！別把頭搖

- 掉了」單張、「第八版反毒明星書卡」各300份及「輕鬆喜劇拒絕毒品」光碟20片等文宣品至全國各校外會，並函請轉交所轄各級學校，於學期結束前，加深學生對毒品危害之認知，以達防患未然之效。
3. 為配合檢警調等機關查緝偽、禁藥品，本局於1月19日指派兩位同仁，會同法務部調查局航業海員調查處臺中站，分兩組至桃園縣及臺北縣同步搜索查緝非法藥品。北縣部分在板橋地檢署檢察官之指揮下，破獲位於五股工業區之「佳鋁國際有限公司」為製造偽藥工廠，查獲「Stilnox