

醫護人員應特別留意病患使用吩坦尼貼片後之狀況

◆製藥工廠 施如亮科長

吩坦尼貼片是經由皮膚吸收的一種長效型全身性止痛藥，它的主成分吩坦尼，也是一種嗎啡類的麻醉藥品，止痛效果為嗎啡的80-100倍，常用於伴隨有長期劇烈疼痛的癌症病患。在台灣，目前一年約一千多人使用該止痛貼片。

美國食品藥物管理局(FDA)曾經在2005年7月針對吩坦尼貼片的使用發出一警訊，提醒醫護人員、病患、病患家屬或看護人員，內容包括醫師應事先評估病患的疼痛狀況、其他併用藥品之使用情形、詳細告知病患使用吩坦尼貼片之方法及留意副作用或過量時的症狀。本局也在當時將警訊內容摘要，通知各醫療院所轉知醫護人員及病患。

然而，在美國，儘管FDA、製造商及一些用藥安全機構的不斷提醒，吩坦尼貼片仍然繼續被不當處方在處理對鴉片類藥物沒有耐受性之病患的急性疼痛上，有時是劑量太大，有時是併用其他口服或注射鴉片類藥物，而這些錯誤的處方更不乏出現在大醫院，再者，為藥物安全把關的藥師及護理人員給藥時也未發現錯誤。

為此，美國FDA於96年12月21日再度發布警訊，重申這種貼片只適用於中度或嚴重且長期疼痛的病患，不適用於突然、偶發、輕度疼痛，或手術後之疼痛。這種貼片也不應是第一線用藥，它僅適用於已規律使用嗎啡等強效鴉片類止痛藥達一個星期以上的病患。另外，由於熱度會增加藥品進入血液的劑量，引起致命性的過量，因此使用貼片時，不要用熱墊、電毯、加熱的水床，或洗三溫暖、泡熱水澡，或日光浴。病人體溫超過攝氏39度時，也要立刻詢問醫師如何處理。如果發生包括呼吸困難、呼吸深度變淺、深度睡眠、無法正常思考、無力正常說話及行走、有快昏倒的感覺、頭暈等症狀，病患及照護者應該立刻求醫。本局也再次呼籲，吩坦尼貼片是醫師評估病患必須長期使用，以緩解劇烈疼痛的一種用藥選擇，如果正確使用，不必害怕成癮，但是止痛貼片的藥效及副作用極強，必須特別注意。除了醫師應審慎處方外，醫藥專業人員更應加強對使用吩坦尼貼片病患及家屬之教育，並追蹤病患使用後之狀況，以避免不良反應之發生。



召開「行政院衛生署濫用藥物尿液檢驗機構認可委員會」96年第3次會議



◆篩檢認證組

本局於96年12月18日召開「行政院衛生署濫用藥物尿液檢驗機構認可審議委員會」96年第3次會議，審議通過「慈濟大學濫用藥物檢測中心」及「正修科技大學」申請尿液中愷他命(ketamine)檢驗項目認可案。