

中毒風險。在開始使用任何新藥物時，請一起告知醫師您正在使用的所有藥物，包括非處方藥和草藥補充劑。使用藥物期間應避免飲酒或未經醫師指示與其他藥物共用。

4. 定期複診

服用此類藥物時，應定期到醫院複診，評估藥物的效果與可能的副作用，確保藥物的使用不會對健康造成影響。

5. 不適用於特定族群

配西汀禁止用於新生兒與六個月以下的嬰兒。對於有中樞神經功能受抑制、昏迷、頭部外傷或顱內壓增高的病人，也不建議使用。

總之，配西汀類藥物需要在醫師的指導下使用，以避免濫用或誤用，確保治療效果並減少風險。如果對藥物有任何疑問或不適反應，應及時諮詢醫師或藥師。

肉毒桿菌毒素製劑， 也需要封緘檢驗

食藥署把關您的安全

肉 毒桿菌毒素是肉毒桿菌 (*Clostridium botulinum*) 產生的神經毒素，可阻斷神經末梢釋放乙醯膽鹼 (acetylcholine)，造成肌肉放鬆或肌肉麻痺的效果，在美容與醫療領域有多種用途，並且為需要經食藥署逐批封緘檢驗合格後才可販售的生物藥品，目前國內核准之肉毒桿菌毒素製劑共有七張許可證。

2025年初國內曾發生民眾透過網路平台購買不明來源的肉毒桿菌毒素製劑，於注射後陸續出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂及肌肉無力等疑似肉毒桿菌毒素中毒症狀，甚至入住加護病房插管治療。

使用不明來源的肉毒桿菌毒素製劑對健康風險極高，嚴重時可導致呼吸困難而死亡。因此，使用合法肉毒桿菌毒素製劑，

並於合法醫療機構施打，對安全性和療效才有保障。

如何辨識合法肉毒桿菌毒素製劑，請牢記簡易辨識123：

1. 認明許可證字號 | 肉毒桿菌毒素製劑上市前皆須向食藥署申請查驗登記，經過審查及檢驗合格以取得藥品許可證，產品之外盒均標示有核可之許可證字號及品名。

2. 完整藥物檢查證 | 每批肉毒桿菌毒素製劑皆須由食藥署審查檢驗合格後，核發封緘證明書，並於產品外盒封口處完整黏貼「藥物檢查證」才可販售。

3. 內外標示資訊相同 | 外盒及瓶身標示的批號、製造日期與有效日期應相同。

